

南伊豆 (3302)

観測開始:1964年2月 所在地:静岡県加茂郡南伊豆町

(単位: m)

観 測 年 月			1967.8 (昭和42年)	1968.2 (昭和43年)	1973.2 (昭和48年)	1973.1 (昭和48年)	1974.9 (昭和49年)	1975.3 (昭和50年)	
取付水準点		9364	標高 (m)	—	4.4162	4.4162	4.4162	—	4.4162
距離 (km)	3.85	B ・ M		高 低 差 (m)	—	-2.6883	-2.6843	-2.6899	—
	0.02		球 分 体		+1.361	+1.3622	—	+1.361	+1.3570
観 測 方 法			2級水準	一等水準	一等水準	2級水準	一等水準	一等水準	
備 考									

観 測 年 月			1977.9 (昭和52年)	1978.1 (昭和53年)	1978.8 (昭和53年)	1980.6 (昭和55年)	1983.1 (昭和58年)	1983.11 (昭和58年)	
取付水準点		9364	標高 (m)	4.4162	4.4162	4.4162	4.4630	4.4799	4.4799
距離 (km)	3.85	B ・ M		高 低 差 (m)	-2.6532	-2.6532	-2.6500	-2.6945	-2.6831
	0.02		球 分 体		+1.3561	+1.3560	+1.3560	+1.3560	+1.357
観 測 方 法			一等水準	一等水準	一等水準	一等水準	2級水準	一等水準	
備 考						9364移転 (1979.12)	9364改測 (1980.6)		

観 測 年 月				1984.7 (昭和59年)	1986.7 (昭和61年)	1988.7 (昭和63年)	1990.6 (平成2年)	1991.1 (平成3年)	1993.7 (平成5年)
取付水準点		9364	標高 (m)	4.4799	4.4799	4.4799	4.4799	—	4.4799
距離 (km)	3.85		高 低 差 (m)	-2.6870	-2.6806	-2.6750	-2.6712	—	-2.6620
	0.02	—		+1.3552	+1.3552	+1.3545	+1.356	+1.3537	
		球 分 体							
観 測 方 法				一等水準	一等水準	一等水準	一等水準	2級水準	一等水準
備 考									

観 測 年 月				1995.7 (平成7年)	1997.6 (平成9年)	1999.6 (平成11年)	2000.12 (平成12年)	2001.8 (平成13年)	2002.4 (平成14年)
取付水準点		9364	標高 (m)	4.4799	4.4799	4.4799	4.4799	4.4799	4.3701
距離 (km)	3.85		高 低 差 (m)	-2.6566	-2.6538	-2.6516	-2.6499	-2.648	-2.648
	0.02	B ・ M		+1.3535	+1.3529	+1.3520	+1.3521	+1.352	+1.352
		球 分 体							
観 測 方 法				一等水準	一等水準	一等水準	一等水準	2級水準	2級水準
備 考									2000年度平均成果に切換

(単位：m)

観 測 年 月				2003.12 (平成15年)	2005.11 (平成17年)	2007.9 (平成19年)	2008.2 (平成20年)		
取付水準点		9364	標高 (m)	4.3701	4.3701	4.3701	験潮場廃止		
距離 (km)	3.85	B ・ M	高低差 (m)	-2.6448	-2.6436	-2.6410			
	0.02			+1.3515	+1.3516	+1.3518			
		球 分 体							
観 測 方 法				一等水準	一等水準	一等水準			
備 考									

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。