

巖 原 (3503)

観測開始:1947年7月 所在地:長崎県対馬市巖原町東里

(単位 : m)

観 測 年 月			1950.6 (昭和25年)	1951.5 (昭和26年)	1952.5 (昭和27年)	1960.4 (昭和35年)		
取付水準点		対 1	標高 (m)	3.2693	—	3.2693	験潮場移設	
距離 (km)	—	B・M	高低差 (m)	-0.809	—	-0.823		
	—			—	-0.380	-0.365		
		球 分 体						
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準		
備 考								

観 測 年 月			1960.4 (昭和35年)	1964.3 (昭和39年)	1969.2 (昭和44年)	1973.1 (昭和48年)	1974.5 (昭和49年)	1982.12 (昭和57年)
取付水準点		対 1	標高 (m)	3.2693	3.2693	3.2693	—	3.2693
距離 (km)	0.87	B・M	高低差 (m)	-0.812	-0.809	-0.853	—	-0.881
	0.05			-0.193	-0.212	-0.189	-0.192	-0.201
		球 分 体						
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備 考					B・M再設			

観 測 年 月			1982.12 (昭和57年)	1984.3 (昭和59年)	1984.3 (昭和59年)			
取付水準点		対 1	標高 (m)	3.2693	—	験潮場移設		
距離 (km)	0.90	B・M	高低差 (m)	-0.767	—			
	0.04			-0.315	-0.317			
		球 分 体						
観 測 方 法				2級水準	2級水準			
備 考			B・M変更					

観 測 年 月			1984.3 (昭和59年)	1984.6 (昭和59年)	1990.1 (平成2年)	1995.9 (平成7年)	2001.6 (平成13年)	2002.4 (平成14年)
取付水準点		対 1	標高 (m)	—	3.2693	3.2693	3.2693	3.225
距離 (km)	0.90	(TUSIMA01)	高低差 (m)	—	-0.746	-0.748	-0.742	-0.740
	0.04	B・M		-0.425	-0.426	-0.426	-0.424	-0.426
		球 分 体						
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備 考			球分体変更					2000年度平均成果に切換

(単位：m)

観 測 年 月			2006.6 (平成18年)	2011.9 (平成23年)	2013.10 (平成25年)	2017.3 (平成29年)	2025.4 (令和7年)	
取付水準点		対 1 (TUSIMA01)	3.225	3.225	—	3.225	3.132	
距離 (km)	0.90	B ・ M	-0.743	-0.747	—	+1.388	—	
	0.04		-0.424	-0.424	-0.423	+0.226	—	
		球 分 体						
観 測 方 法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準		
備 考							測地成果 2024に切換	

・測地成果2024については、以下のHPをご覧ください。

全国の標高成果の改定 <<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>>

・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧ください。

<<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>>