

栗 島 (3602)

観測開始:1965年6月 所在地:新潟県岩船郡栗島浦村

(単位: m)

観 測 年 月				1965.4 (昭和40年)	1965.1 (昭和40年)	1966.9 (昭和41年)	1967.9 (昭和42年)	1968.9 (昭和43年)	1970.1 (昭和45年)
取付水準点			標高 (m)	—	—	—	—	—	—
距離 (km)		B ・ M	高 低 差 (m)	—	—	—	—	—	—
				+0.572	+0.579	+0.580	+0.580	+0.581	+0.581
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備 考									

観 測 年 月				1973.7 (昭和48年)	1981.3 (昭和56年)				
取付水準点			標高 (m)	—	験潮場移設				
距離 (km)		B ・ M	高 低 差 (m)	—					
				+0.580					
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準					
備 考									

観 測 年 月				1981.3 （昭和56年）	1983.3 （昭和58年）	1989.9 （平成元年）	1994.1 （平成6年）	1994.1 （平成6年）	1994.1 （平成6年）
取付水準点		101	標高 (m)	—	—	—	—	験潮場移設	—
			高 低 差 (m)	—	—	—	—		—
距離 (km)	B・M	+0.653		+0.649	+0.646	+0.646			+0.632
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準		2級水準
備 考				球分体変更					

観 測 年 月				1994.3 (平成6年)	1995.1 (平成7年)	1996.3 (平成8年)	1999.5 (平成11年)	2001.8 (平成13年)	2002.4 (平成14年)
取付水準点		101	標高 (m)	—	2.8797	2.8797	2.8797	2.8797	2.8580
			高 低 差 (m)	—	-0.7702	-0.7700	-0.771	-0.770	-0.770
距離 (km)		B・M		+0.632	+0.6295	+0.6292	+0.632	+0.631	+0.631
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	一等水準	一等水準	2級水準	2級水準	2級水準
備 考							地殻変動観測点101をⅡ □10476に名称変更		2000年度平 均成果に切換

(単位：m)

観 測 年 月			2005.1 (平成17年)	2007.1 (平成19年)	2008.9 (平成20年)	2009.1 (平成21年)	2012.12 (平成24年)	2016.9 (平成28年)
取付水準点		Ⅱ 10476	標高 (m)	2.8580	2.8580	2.8580	2.8580	2.8580
距離 (km)				B ・ M	-0.769	-0.7690	-0.769	-0.769
		球 分 体	+0.629		+0.629	+0.629	+0.630	+0.630
観 測 方 法			2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準	2級水準
備 考								

観 測 年 月			2017.10 (平成29年)	2020.8 (令和2年)	2022.10 (令和4年)	2025.4 (令和7年)				
取付水準点		Ⅱ 10476	標高 (m)	2.8580	2.8580	2.8580	2.809			
距離 (km)		B ・ M		高 低 差 (m)	-0.769	-0.769	-0.769	—		
					+0.628	+0.628	+0.628	—		
					球 分 体					
観 測 方 法			2級水準		2級水準	2級水準				
備 考						測地成果 2024に切換				

・測地成果2024については、以下のHPをご覧ください。

全国の標高成果の改定 <<https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html>>

・「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のHPをご覧ください。

<<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>>