

紋 別 (3701)

観測開始:1955年12月 所在地:北海道紋別市弁天町

(単位 : m)

観 測 年 月				1956.6 (昭和31年)	1966.12 (昭和41年)	1968.9 (昭和43年)	1971.7 (昭和46年)	1973.9 (昭和48年)	1978.1 (昭和53年)
取付水準点		8948	標高 (m)	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412
距離 (km)		B ・ M	高低差 (m)	-10.599	—	-7.041	-10.2205	-7.044	-10.271
	0.56			+0.440	-3.173	-3.178		-3.192	
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準
備 考					BM変更				

観 測 年 月				1978.1 (昭和53年)	1966.12 (昭和41年)	1968.9 (昭和43年)	1971.7 (昭和46年)	1973.9 (昭和48年)	1978.1 (昭和53年)	
取付水準点		8948		標高 (m)	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412	12.0412	
距離 (km)	0.56	B ・ M			高低差 (m)	—	−7.041	−10.2205	−7.044	−10.271
		球 分 体				−3.173	−3.178		−3.192	
観 測 方 法					2級水準	2級水準	一等水準	2級水準	2級水準	
備 考					BM変更					

観 測 年 月				1978.1 (昭和53年)	1984.8 (昭和59年)	1991.6 (平成3年)	1996.6 (平成8年)			
取付水準点		8947		標高 (m)	12.0412	—	6.8238	6.9298		
距離 (km)	—	B ・ M		高 低 差 (m)	-6.857	—	-1.636	-1.728		
	—				-3.113	-3.116	-3.119	-3.120		
	球 分 体									
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	2級水準			
備 考				BM、球分体 変更 取付水準点 は8948			8947移転 (1995.7)			

(単位：m)

観 測 年 月				2001.8 (平成13年)	2002.9 (平成14年)	2003.1 (平成15年)	2005.8 (平成17年)	2006.6 (平成18年)	2008.3 (平成20年)
取付水準点		8948	標高 (m)	12.0412	11.9507	—	11.9507	11.9507	験潮場廃止
距離 (km)	—	B・M	高低差 (m)	-6.863	—	—	-9.8021	-9.8040	
	—			-3.117	-3.119	-2.940			
		球 分 体							
観 測 方 法				2級水準	2級水準	2級水準	一等水準	一等水準	
備 考					2000年度平均成果に切換	球分体変更			

※平均成果とは地域を一括して、標高改測する作業です。

「2000年度平均成果」と「測地成果2011」については以下のとおり。

<http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-2000seika.html>

その他の平均成果(昭和44年度平均成果など)は、総称して旧成果と呼びます。

また、2000年(度なし)成果など略称が使われることがあります。